

Comunicaciones Balón Intragástrico

MENDOZA 2013

1-BALON INTRAGASTRICO PRE QUIRURGICO EN SUPER OBESOS.

AUTORES: DRES; OLIVA Mariana, ALVAREZ Esteban, BECCHETTI Ignacio, TALLIA Agustín, SOSA GALLARDO Carlos.

CTOM, Centro de Tratamiento de Obesidad y Enfermedades Metabólicas

Cirugía Bariátrica Hospital Cordoba

Cordoba Argentina

ANTECEDENTES: Se considera la dificultad del descenso de peso pre operatorio en el paciente súper super-obeso, con el fin de disminuir el riesgo quirúrgico.

OBJETIVO: colocación de balón intragástrico para obtener entre un 15 y 25 % de exceso de peso perdido.

DISEÑO: descriptivo-prospectivo.

MATERIAL Y METODO: Se colocaron desde Octubre 2010 hasta diciembre 2012, 48 balones intragástricos, 22 mujeres y 26 hombres, de los cuales 18 fueron en pacientes súper súper-obesos con un IMC mayor de 60, promedio 68.1; que no pudieron bajar de peso con dieta. A 2 pacientes se lo tuvo que retirar antes de tiempo. Todos los balones fueron colocados por vía endoscópica, insuflados con un promedio de 620 cc de solución fisiológico, más azul de metileno, por 6 meses. A los 30 y 60 días de retirado el mismo se practico la cirugía bariátrica.

RESULTADOS:

Al primer mes IMC 60.4 y %EPP 16.65

3 mes: IMC 58.9 y %EPP 19.7

6 mes: IMC 57.3 y %EPP 23.2

CONCLUSIONES: Todos los pacientes lograron un descenso de IMC deseado de 10 puntos aproximadamente, el cual disminuyo en forma considerable el riesgo quirúrgico.